



# MALTRATO EN LACTANTES: LA PUNTA DE LA PUNTA DEL ICEBERG

Dra. Sofía Vallejo (1), Dra. María López (1), Dra. Lucía Liquete (1), Dra. Ana de Vicente (1), Dra. Marta Sánchez-Deusa (1), Dr. Luis Alonso (1).

(1) Servicio de Pediatría Hospitalaria. Hospital Universitario La Paz, Madrid.

## INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha descrito un aumento en las notificaciones de sospecha de maltrato infantil (MI), probablemente debido a una mayor sensibilización del personal sanitario. Sin embargo, el MI continúa infradiagnosticado. La detección es aún más difícil en el caso de los lactantes, quienes son los más vulnerables. El objetivo de este estudio es describir nuestra experiencia en un hospital terciario en la notificación y el manejo del maltrato en lactantes.

## METODOLOGÍA

Estudio descriptivo retrospectivo unicéntrico, en el que se estudian las notificaciones del registro Unificado de Maltrato Infantil (RUMI) de un hospital infantil durante 2018. Se revisaron las historias clínicas y se incluyeron los datos epidemiológicos así como su manejo y seguimiento.



## CONCLUSIONES

- Elevada representación de lactantes en la muestra, debido al potente servicio de neonatología del hospital.
- El tipo de MI más frecuente fue el físico, demostrando la dificultad en la detección de la negligencia en este grupo etario.
- El agresor forma parte del círculo de confianza de la víctima, ya que la mayoría de las agresiones se produjeron en el domicilio de la víctima.
- Se hace fundamental la concienciación y formación del personal sanitario, pues las enfermedades comunes son motivos frecuentes de consulta.
- Gran complejidad en el manejo de estos casos, requiriendo un abordaje multidisciplinar e ingreso hospitalario en muchas ocasiones.

## RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Durante el periodo de estudio se notificaron un total de 180 sospechas de MI, de las cuales un 17.2% correspondían a lactantes menores de 12 meses. La forma sospechada de maltrato más frecuente fue el maltrato físico (54,8%) seguido de la negligencia (29%). El motivo de consulta más frecuente en los lactantes fue “traumatismo”, seguido de “enfermedad común” y “sospecha de maltrato”.

Motivo de consulta



En 61% de las ocasiones, el evento tuvo lugar en el domicilio, mientras que el porcentaje restante ocurrió en lugares públicos. La mayoría de las notificaciones procedían del Servicio de Urgencias, seguido de Neonatología.

Servicio que comunica



Un 61% de los casos requirió ingreso en el hospital y casi el 10% fueron dados de alta con una familia de acogida o institución. En el 97% de los casos se realizó seguimiento por Servicios Sociales, y en un 67% por los Servicios de Salud.

